

SUMARIO

7

ALGORITMO

Vómitos agudos

11

TÉCNICAS PRINCIPALES

Diagnóstico diferencial
y protocolo diagnóstico
de la hematemesis

Tratamientos
antieméticos


17

Fluidoterapia en
animales con signos
gastrointestinales (I)

25

Fluidoterapia en
animales con signos
gastrointestinales (II)

33



Diagnóstico diferencial y protocolo diagnóstico de la hematemesis

La hematemesis se define por la presencia de sangre en cantidades más o menos importantes en el vómito. Si se observan muy pequeñas partículas de sangre en el vómito, suele ser secundario a vómitos vigorosos mientras que si la cantidad de sangre es importante, suelen observarse vómitos en poso de café. Es importante recordar que el hecho que no se vea sangre macroscópicamente no permite excluir la presencia de sangrado digestivo. Por otro lado, es imprescindible diferenciar la hematemesis de origen digestivo bajo de hemoptisis o de sangrado bucal (*Imagen 1*).




Imagen 1

Los diferenciales a tener en cuenta en el caso de hematemesis son:

- Fármacos y tóxicos:
 - Anti-inflamatorios no esteroideos.
 - Glucocorticoides (la dexametasona en concreto suele tener más repercusiones gastrointestinales que otros glucocorticoides).
 - Agentes de quimioterapia.
 - Radioterapia¹
 - Agua oxigenada (no recomendada en gatos como agente emetizante)²

técnicas principales hematemesis

- Enfermedades extradigestivas
 - Enfermedad hepática
 - Enfermedades hormonales (en concreto hipoadrenocorticismo)
 - *Shock*
 - Neoplasias: mastocitomas (*Imagen 2*)
 - Anomalías de la hemostasia primaria/secundaria (*Imagen 3: hematoma escleral en un animal con trombocitopenia*).

