

SUMARIO

7

ALGORITMO

Vómitos crónicos

11

TÉCNICAS PRINCIPALES

Cómo realizar una prueba de estimulación con ACTH cuando hay sospecha de hipoadrenocorticismo (Enf. de Addison)

19


Cómo realizar una
gastroduodenoscopia

25

Cómo realizar una
prueba dinámica de
Ácidos Biliares

31

Cómo realizar una
punción de Linfonodos
Mesentéricos
ecoguiada



Cómo realizar una prueba de estimulación con ACTH cuando hay sospecha de hipoadrenocorticismismo (Enf. de Addison)

Indicaciones de la prueba de estimulación con ACTH:

La prueba de estimulación con ACTH es una prueba muy sensible y muy específica para el diagnóstico de hipoadrenocorticismismo y debe realizarse siempre que sospechemos de un caso, en un animal con signos clínicos y laboratoriales compatibles (*Imagen 1*).



Imagen 1

Procedimiento:

1. Obtenemos una muestra de sangre en heparina o en un tubo seco (al menos 2 ml) (*Imagen 2*).

técnicas principales estimulación con ACTH



2. Administración de ACTH sintética intravenoso o intramuscular (más doloroso)
(*Imágenes 3, 4 y 5*).

