



VetPen®



Pensado
para su comodidad
en el control eficaz de la diabetes



La diabetes es, cada día más, una enfermedad que afecta a nuestras mascotas, tanto perros como gatos.

Conseguir un **buen control de la enfermedad** , y sobre todo, una **buena calidad de vida para ellos** , es nuestro principal objetivo. El tratamiento diario necesario hace que la **COMODIDAD** del mismo sea una parte fundamental del éxito terapéutico.

VetPen[®] está hecho para que el "día a día" de la inyección de insulina sea **SENCILLA, FÁCIL Y RÁPIDA**, y sobre todo, **SEGURA**.



VetPen[®]

Pensado
para su **COMODIDAD**
en el control eficaz de la diabetes

Pensado para el veterinario

- ▶ que ofrecerá una **herramienta terapéutica eficaz y segura**, que asegura un buen CUMPLIMIENTO del tratamiento

Pensado para el propietario de la mascota

- ▶ que podrá administrar Caninsulin[®] de una forma **CÓMODA y SENCILLA** facilitando su día a día

Pensado para la mascota

- ▶ ya que **REDUCIMOS el estrés** a la hora de administrar y **MEJORAMOS su calidad de vida** al conseguir un mejor control

Con Caninsulin® y VetPen®...

Nunca fue tan fácil controlar la

DIABETES DE LAS MASCOTAS

Un completo y cómodo pack
que se adapta a cualquier estilo de vida

EL KIT DE INICIACIÓN DE VETPEN® INCLUYE:



Breve guía sobre los componentes de VetPen®

- ▶ Esquema simple e ilustrado que muestra los componentes y accesorios de VetPen®



Folleto de instrucciones

- ▶ Instrucciones fáciles de seguir, paso a paso con fotos que muestran al propietario cómo cargar, usar y guardar la "pluma"



Eliminador de agujas

- ▶ Dispositivo que permite la extracción segura de las agujas de la "pluma"



28 Agujas

- ▶ Un abundante suministro de agujas para comenzar. Estas agujas ultrafinas presentan un revestimiento de silicona para minimizar las molestias de la inyección



Funda de viaje

- ▶ Funda flexible para guardar la pluma, las agujas, el eliminador de agujas y los cartuchos de Caninsulin®

NOTA: Los cartuchos de insulina se venden por separado y están disponibles en paquetes de 10

Lo que necesitas
saber sobre

VetPen

de manera simple
y sencilla

Dispone en internet
del vídeo explicativo
de uso de VetPen®



En el tratamiento de la diabetes en perros y gatos



VetPen®

SENCILLEZ Y COMODIDAD

para el veterinario, el propietario y las mascotas

- ▶ Compacto y fácil de usar
- ▶ Más cómodo para el día a día del tratamiento diabético
- ▶ Mejora el cumplimiento del tratamiento por parte del propietario
- ▶ Reduce el riesgo de roturas y derrames en el manipulado de la insulina
- ▶ Versatilidad, puede usarse incluso mientras el animal está andando



VetPen® está disponible en dos versiones que se adaptan a los tamaños y dosificaciones:

- VetPen® 8, que proporciona 0,5 a 8 unidades por inyección
- VetPen® 16, que proporciona 1 a 16 unidades por inyección





VetPen®



VetPen® está disponible en dos versiones: VetPen® 8, que proporciona 0,5 a 8 unidades por inyección, y VetPen® 16, que proporciona 1 a 16 unidades por inyección.

CANINSULIN 40 UI/ml SUSPENSIÓN INYECTABLE. COMPOSICIÓN POR ml: Sustancia activa: Insulina porcina 40,00 UI (insulina de origen porcino que se presenta como una mezcla del 65% de insulina-zinc en forma cristalina y del 35% en forma amorfa). Excipientes: Parahidroxibenzoato de metilo (E 218) 1,00 mg; otros excipientes, c.s. **INDICACIONES Y ESPECIES DE DESTINO:** Perros y gatos. Indicado en los casos de diabetes mellitus (deficiencia absoluta o relativa de insulina) en perros y gatos, para reducir la hiperglucemia y los síntomas clínicos asociados a la misma mediante un ajuste individual de la dosis de medicamento. **CONTRAINDICACIONES:** El medicamento no debe ser administrado por vía intravenosa. El medicamento contiene una insulina de origen porcino con una acción de duración media y no está indicado para el tratamiento inicial de animales con diabetes mellitus aguda grave que se presenten en un estado cetoacidótico. No usar en animales con antecedentes de hipersensibilidad a productos de origen porcino y/o alguno de los excipientes. **PRECAUCIONES:** Debido a la variación día a día de la respuesta de glucosa en sangre y las variaciones de la receptividad a la insulina que se van viendo con el tiempo, los propietarios de los animales deben ser instruidos para reconocer los síntomas de hipo- o hiperglucemia e informar, en su caso, a su veterinario sobre cualquier posible efecto inusual detectado, incluyendo aquellos relacionados con la eficacia del medicamento. Precauciones especiales para su uso en animales: Antes de administrar este medicamento, debe recomendarse a los propietarios tener en casa una caja de glucosa en polvo. Los síntomas clínicos de hambre, aumento de la ansiedad, caminar inestable, convulsiones musculares, tropezones o flexión de los cuartos traseros y desorientación del animal, indican hipoglucemia y requieren la inmediata administración de solución glucosada y/o alimento para restablecer las concentraciones normales de glucosa en sangre. Evitar el estrés y ejercicio excesivo e irregular. Asimismo, el uso de corticosteroides debe realizarse con precaución. Debe evitarse el uso de progestágenos (inhibidores del estro) en pacientes que sufren diabetes mellitus. En perras enteras, debe contemplarse la ovariectomía como opción. Es importante establecer un esquema estricto de alimentación que incluya las mínimas fluctuaciones y cambios posibles. Después de establecer la dosis de mantenimiento, deben comprobarse de forma periódica los niveles de glucosa en sangre y orina. El medicamento debe ser administrado con jeringas estériles específicas de un solo uso de 40 UI (vial) o con VetPen (cartucho). Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento a los animales: La autoinyección accidental puede provocar síntomas clínicos de hipoglucemia que deben ser tratados con la administración oral de glucosa. La autoinyección accidental puede provocar reacciones de hipersensibilidad (alergia). Las personas diabéticas insulina-dependientes, deben extremar las precauciones al administrar el medicamento veterinario. En caso de autoinyección accidental, consulte con un médico inmediatamente y muéstrele el prospecto o la etiqueta. Su uso no está contraindicado durante los períodos de gestación y lactancia, pero requiere una estrecha supervisión veterinaria para detectar los cambios en los requerimientos metabólicos durante los mismos. Conservar en nevera (entre 2 °C y 8 °C) en posición vertical. Proteger de la luz. No congelar. Tras la primera apertura del envase, conservar a temperatura inferior a 25 °C. Período de validez después de abierto el envase primario: 20 días. **Uso veterinario – medicamento sujeto a prescripción veterinaria. Administración bajo control o supervisión del veterinario** Instrucciones completas en el prospecto. Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños. Reg. Nº: 869 ESP. Merck Sharp & Dohme Animal Health, S.L. Ficha técnica actualizada a 23 de agosto de 2017.