

ELANCO EXPERTO EN COMPRIMIDOS DELICIOSOS PARA GATOS



Credelio® para gatos

Tratamiento:
Garrapatas y pulgas*.



Milbemax para gatos

Tratamiento:
Cestodos y nematodos intestinales.
Prevención de la filariosis*.



Onsior 6mg para gatos

Tratamiento:
Dolor agudo y crónico;
dolor posoperatorio*.



Fortekor Sabor 2,5 mg para gatos

Tratamiento:
Reducción de la proteinuria en ERC*.



*Para más información consulta las fichas técnicas completas.



¿MIEDO A LO NUEVO?

Cuando pruebas lo fácil y práctico que resulta combatir parásitos y enfermedades crónicas con comprimidos deliciosos, no volverás atrás.

¹ Kynetec. April 2018. Data on file. ² The Behavioural Architects. October 2017. Data on file. ³ Credelio RCP. ⁴ Cavalleri D et al. 2018. "A randomised, blinded, positive controlled, multicentre pivotal field study to evaluate the efficacy and safety of lotilaner tablets for cats administered orally at a minimum dose rate of 6.0 mg/kg to cats naturally infested with ticks." Parasites & Vectors. ⁵ Kynetec April 2018- Onsior DJD study. ⁶ Onsior RCP. ⁷ Elanco Animal Health, data on File Novartis AH CRA 09- 079 2009.

ONSIOR 6 mg comprimidos para gatos. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN: Elanco GmbH, Heinz-Lohmann-Str. 4, 27472 Cuxhaven, Germany. **COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA, Sustancia activa:** Cada comprimido contiene: Robenacoxib 6 mg. **Indicaciones de uso:** Para el tratamiento del dolor y la inflamación asociados a trastornos músculo-esqueléticos agudos o crónicos en gatos. Para la reducción del dolor moderado y la inflamación asociados con la cirugía ortopédica en gatos. **Contraindicaciones:** No usar en gatos que padezcan úlceras gastrointestinales. No usar simultáneamente con corticosteroides ni otros antiinflamatorios no esteroideos (AINEs). No usar en caso de hipersensibilidad a la sustancia activa o a algún excipiente. No usar en animales gestantes ni lactantes. **Precauciones especiales para su uso en animales:** No se ha establecido la seguridad del medicamento veterinario en gatos con un peso inferior a 2,5 kg ni de menos de 4 meses de edad. El uso en gatos con insuficiencia cardíaca, renal o hepática, o en gatos deshidratados, hipovolémicos o hipotensos, puede comportar otros riesgos adicionales. Si no se puede evitar su uso, estos gatos requieren una monitorización cuidadosa. El veterinario debe monitorizar la respuesta al tratamiento a largo plazo a intervalos regulares. Estudios clínicos de campo han demostrado que el robenacoxib fue bien tolerado por los gatos en tratamientos de hasta 12 semanas. No usar este medicamento veterinario, sin la estricta monitorización por el veterinario, en gatos con riesgo de úlcera gastrointestinal o si el gato ha presentado, previamente, alguna intolerancia a otros AINEs. **Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento veterinario a los animales:** Lávese las manos después de usar este medicamento veterinario. En caso de ingestión accidental, consulte con un médico inmediatamente y muéstrela el texto del envase o el prospecto. En niños pequeños, la ingestión accidental aumenta el riesgo de efectos adversos por los AINEs. En caso de ingestión accidental, consulte con un médico inmediatamente y muéstrela el texto del envase o el prospecto. En las mujeres embarazadas, sobre todo cerca del final del embarazo, una exposición dérmica prolongada incrementa el riesgo de cierre prematuro del conducto arterioso del feto. **Tiempo de espera:** n/a. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria. **Nº de registro:** EU/2/08/089/001-003; EU/2/08/089/021.

CREDELIO 12 mg comprimidos masticables para gatos (0,5-2,0 kg) / CREDELIO 48 mg comprimidos masticables para gatos (>2,0-8,0 kg). TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN: Elanco GmbH, Heinz-Lohmann-Str. 4, 27472 Cuxhaven, Germany. **COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA - Sustancia activa:** para gatos (0,5-2,0 kg): 12 mg de lotilaner; para gatos (>2,0-8,0 kg): 48 mg de lotilaner. **Indicaciones de uso:** Indicado para el tratamiento de infestaciones de pulgas y garrapatas en gatos. Este medicamento veterinario proporciona una acción inmediata y persistente durante un (1) mes contra las pulgas (*Ctenocephalides felis* y *C. canis*) y garrapatas (*Ixodes ricinus*). Las pulgas y las garrapatas deben estar pegadas al perro y realizar su ciclo alimenticio para quedar expuestas a la sustancia activa. El medicamento veterinario puede usarse como parte de una estrategia de tratamiento para el control de la dermatitis alérgica por pulgas ("flea allergy dermatitis", FAD). **Contraindicaciones:** No usar en casos de hipersensibilidad a la sustancia activa o a algún excipiente. **Precauciones especiales para su uso en animales:** Para una buena práctica clínica, los animales se deben pesar para asegurar una dosificación exacta. La equinococosis es un riesgo para las personas. En caso de equinococosis se deben seguir unas directrices específicas de tratamiento y seguimiento, y de seguridad de las personas. Se debe consultar a un experto o instituto de parasitología. No se han hecho estudios en gatos gravemente debilitados o en individuos con las funciones hepática o renal seriamente comprometidas. Este producto no se recomienda en estos animales, o solamente tras la correspondiente valoración del riesgo / beneficio por parte del veterinario responsable. **Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento veterinario a los animales:** Lávese las manos después de su uso. En caso de ingestión accidental de los comprimidos, en especial en caso de niños, consulte con un médico inmediatamente y muéstrela la etiqueta y/o el prospecto. **Tiempo de espera:** No procede. **NUMERO(S) DE LA AUTORIZACION DE COMERCIALIZACION:** EU/2/17/206/016-21. Fecha de la primera autorización: 25/04/2017. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.

MILBEMAX COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PARA GATOS PEQUEÑOS Y GATITOS/ MILBEMAX COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PARA GATOS. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN: Elanco GmbH, Heinz-Lohmann-Str. 4, 27472 Cuxhaven, Germany. **COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA, Sustancia activa:** Milbemicina oxima 4 mg/ 6 mg, Prazicuantel 10 mg/ 40 mg. **Indicaciones de uso:** En el gato: para el tratamiento de infecciones mixtas por cestodos y nematodos inmaduros y adultos de las especies siguientes: -Cestodos: *Dipylidium caninum*, *Taenia spp.*, *Echinococcus multilocularis*, -Nematodos: *Ancylostoma tubaeforme*, *Toxocara cati*. Está indicado en la prevención de filariosis (*Dirofilaria immitis*) si un tratamiento concomitante contra cestodos está indicado. **Contraindicaciones:** No usar en gatos de menos de 6 semanas de edad y/o que pesen menos de 0,5 kg (MILBEMAX COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PARA GATOS PEQUEÑOS Y GATITOS)/ No usar en gatos que pesen menos de 2 kg (MILBEMAX COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PARA GATOS). **Precauciones especiales para su uso en animales:** Para una buena práctica clínica, los animales se deben pesar para asegurar una dosificación exacta. La equinococosis es un riesgo para las personas. En caso de equinococosis se deben seguir unas directrices específicas de tratamiento y seguimiento, y de seguridad de las personas. Se debe consultar a un experto o instituto de parasitología. No se han hecho estudios en gatos gravemente debilitados o en individuos con las funciones hepática o renal seriamente comprometidas. Este producto no se recomienda en estos animales, o solamente tras la correspondiente valoración del riesgo / beneficio por parte del veterinario responsable. **Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento veterinario a los animales:** Lávese las manos después de su uso. En caso de ingestión accidental de los comprimidos, en especial en caso de niños, consulte con un médico inmediatamente y muéstrela la etiqueta y/o el prospecto. **Tiempo de espera:** n/a. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria. **Nº de registro:** 1504 ESP/1505 ESP.

FORTEKOR SABOR 2,5 mg, FORTEKOR SABOR 5 mg, FORTEKOR SABOR 20 mg. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN: Elanco GmbH, Heinz-Lohmann-Str. 4, 27472 Cuxhaven, Germany. **COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA, Sustancia activa:** Hidrocloruro de benazepril 2,5 mg/ 5 mg/ 20 mg. **Indicaciones de uso:** Perros: Tratamiento de la insuficiencia cardíaca congestiva (5 mg y 20 mg). Gatos: Reducción de la proteinuria asociada a enfermedad renal crónica (2,5 mg). **Contraindicaciones:** No usar en caso de hipersensibilidad a la sustancia activa o a algún excipiente. No usar en casos de hipotensión, hipovolemia, hiponatremia o fallo renal agudo. No usar en casos de caída del gasto cardíaco debido a estenosis aórtica o pulmonar. No usar durante la gestación ni la lactancia. **Precauciones especiales para su uso en animales:** Durante los ensayos clínicos (en perros o gatos) no se han observado evidencias de toxicidad renal del medicamento, sin embargo, como es rutinario en los casos de enfermedad renal crónica, durante el tratamiento se recomienda monitorizar la creatinina plasmática, la urea y el recuento de eritrocitos. La eficacia y seguridad de FORTEKOR SABOR no se ha establecido en perros y gatos con un peso inferior a 2,5 kg. **Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento a los animales:** Lavarse las manos antes de usar. En caso de ingestión accidental, consulte con un médico inmediatamente y muéstrela la etiqueta o el prospecto. Las mujeres gestantes deberían tomar especial precaución para evitar una exposición oral accidental ya que se ha observado que en humanos los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina (ECA) afectan al feto durante el embarazo. **Tiempo de espera:** n/a. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria. **Nº de registro:** FORTEKOR SABOR 2,5 mg: 1601 ESP, FORTEKOR SABOR 5 mg: 1810 ESP, FORTEKOR SABOR 20 mg 1811 ESP.

3 RAZONES PARA TRATAR LOS PARÁSITOS EN GATOS CON COMPRIMIDOS DELICIOSOS



01

Porque la administración de un spot-on altera el comportamiento del gato y del propietario antes, durante y después del tratamiento^{1,2}:



ANTES:
Intenta evitar el tratamiento.



DURANTE:
Propietario tiene que sostener al gato.



DESPUÉS:
Reacción física / conductual al tratamiento.

02

Porque 3 de cada 5 gatos reaccionan así al ser tratados con un spot on^{1,2}:



Huyen



Se lamen



Se esconden

03

Porque 1 de cada 3 propietarios preferiría tratar a su gato con un pequeño comprimido masticable en lugar de un collar o un spot-on¹.

3 RAZONES PARA TRATAR EL DOLOR EN GATOS CON COMPRIMIDOS DELICIOSOS



01

Porque los veterinarios que ya los prescriben saben que es fácil para el propietario administrarlos⁵.

02

Porque el propietario se asegura que el gato toma toda la dosis⁵.

03



Porque casi 1 de cada 2 propietarios de gato prefiere dar un pequeño comprimido con sabor respecto a una solución oral⁵.



NUEVO CREDELIO PARA GATOS

Credelio® (lotilaner) para gatos es un pequeño y sabroso comprimido mensual contra garrapatas y pulgas específicamente diseñado para gatos³.

La mayoría de los gatos se puede tratar con 1 solo comprimido, 1 vez al mes.

Peso (kg)	0,5 a 2 kg	> 2 a 8 kg
Número de comprimidos	Credelio 12 mg  Ø 5 mm	Credelio 48 mg  Ø 7.5 mm

Dosis recomendada: 6-24 mg lotilaner/kg. Administrar con la comida o hasta 30 min después. Para gatos de más de 8 kg administrar la combinación adecuada de comprimidos.

ESTUDIO DE CAMPO⁴:

211

Gatos domésticos tratados por sus propietarios.

03

Administraciones mensuales consecutivas.

RESULTADO:

100% Administración exitosa.

Administración flexible: en la boca, con comida, en un bol o de la mano.

Único comprimido mensual contra garrapatas y pulgas en gatos.






¡MÍRALO!

Tratar a los gatos contra garrapatas y pulgas, no tiene que ser una gran tarea.

ONSIOR 6 MG PARA GATOS

Onsior 6mg es un pequeño comprimido para tratar el dolor y la inflamación asociados a trastornos musculoesqueléticos agudos o crónicos⁶.

La mayoría de los gatos se puede tratar con 1 solo comprimido, 1 vez al día.

Peso (kg)	2,5 a < 6 kg	6 a 12 kg
Número de comprimidos	Onsior 6 mg 	Onsior 6 mg  

Posología: 1 mg/kg/día (rango 1-2,4 mg/kg). Administrar con una pequeña cantidad de comida o sin comida.

ESTUDIO DE PALATABILIDAD⁷:

Evaluación de la aceptación espontánea de Onsior 6 mg en gatos.

20 Gatos 160 Comprimidos administrados en 8 días.

RESULTADO:

100% Administración exitosa.

99,4% Palatabilidad.

Los comprimidos Onsior son fáciles de administrar.



¡MÍRALO!

MÉTODO:

Se ofrece un comprimido solo o en un bol vacío durante 3 minutos, 4 días seguidos - se repite 1 semana después. Si un comprimido no se consume, se ofrece un segundo comprimido con un poco de comida.