



# El único tratamiento **una vez al día** para el hipotiroidismo canino

UNA VEZ AL DÍA | CÓMODO | MEJOR CUMPLIMIENTO

- **Una vez al día: ayuda al cumplimiento.**
- Bajo volumen: fácil administración.
- Jeringa exclusiva: ajuste y flexibilidad en la dosis.
- Una única presentación.
- Alto perfil de seguridad.
- Uso a largo plazo comprobado.



## Fase de inicio

Hormonas tiroideas*	Dosis de Leventa	
<ul style="list-style-type: none"> <li>T4 total baja</li> <li>TSH alta</li> </ul>	0,2 ml/10 kg p.v. (20 µg/kg p.v. de levotiroxina sódica)	Una vez al día

\*Una T4 total baja junto a una TSH alta puede sugerir hipotiroidismo.

## Ajuste de la dosis:

- Valorar T4 total después de 4 semanas de tratamiento.
- Ajustar la dosis si es necesario en función de la respuesta clínica al tratamiento y la concentración de T4 total, 4-6 horas postratamiento.

## Fase de mantenimiento:

Peso (kg)	Dosis de levotiroxina sódica (µg/kg)			
	10	20	30	40
	Volumen de Leventa (ml)			
5	0,05	<b>0,10</b>	0,15	0,20
10	0,10	<b>0,20</b>	0,30	0,40
15	0,15	<b>0,30</b>	0,45	0,60
20	0,20	<b>0,40</b>	0,60	0,80
25	0,25	<b>0,50</b>	0,75	1,00
30	0,30	<b>0,60</b>	0,90	1,20
35	0,35	<b>0,70</b>	1,05	1,40
40	0,40	<b>0,80</b>	1,20	1,60
45	0,45	<b>0,90</b>	1,35	1,80
50	0,50	<b>1,00</b>	1,50	2,00



**Leventa debe administrarse a la misma hora todos los días. Para conseguir una absorción constante de L-tiroxina, se recomienda administrar Leventa 2-3 horas antes de la comida para maximizar el grado de absorción y minimizar las variaciones en la absorción.**


## Jeringa específica para una dosificación adecuada.



Abrir el frasco y encajar la jeringa dosificadora empujando suavemente el final de la jeringa en la pieza de la boca del frasco.



Poner el frasco con la jeringa boca abajo y extraer la solución a la jeringa tirando del émbolo hasta que el borde del anillo del final del émbolo coincida con el volumen requerido o el peso en kilogramos.



Colocar de nuevo el frasco en la posición vertical y sacar la jeringa de la pieza de la boca del frasco.



Administrar Leventa en la comida o directamente al perro.



Aclarar la jeringa con agua limpia y dejar secar al aire.