

Nobivac 
Essential protection for essential bonds

Nobivac[®] KC

Protección sin dolor



Frente a la "Tos de las perreras" todo un año de protección con una sencilla aplicación intranasal

Nobivac[®] KC **protege a tus pacientes** frente a la traqueobronquitis infecciosa canina o "Tos de las perreras" para que las familias disfruten de sus vacaciones sin preocupaciones, **de manera sencilla y sin dolor.**



Nobivac[®] KC

PARAINFLUENZA CANINA Y *BORDETELLA BRONCHISEPTICA*



VIVA ATENUADA



DOI*

- La **única** vacuna **intranasal bivalente** para la tos de las perreras.
- Puede utilizarse en **programas vacunales concomitantes** con vacunas Nobivac Puppy, Parvo-C, DHPPi, DHP y L4.
- **Fácil de aplicar.** Mínima dosis, 0,4 ml en un **solo orificio nasal.**
- Una **única** dosis, un **año de inmunidad.**
- Puede usarse durante la **gestación.**
- **Rápida respuesta** inmune: 72 horas para *Bordetella bronchiseptica.*
- Puede usarse a partir de las **3 semanas de vida**, puesto que no interfiere con la inmunidad maternal.

*Duración de la inmunidad

NOBIVAC KC. Liofilizado y disolvente para suspensión para administración nasal. COMPOSICIÓN POR DOSIS: Sustancias activas: $\geq 10^{10}$ y $\leq 10^{11}$ cfu¹ de bacterias vivas de *Bordetella bronchiseptica* cepa B-C2; $\geq 10^{10}$ y $\leq 10^{11}$ TCID₅₀² de virus de la parainfluenza canina cepa Cornell. ¹ Unidades formadoras de colonias. ² Dosis infectiva de cultivo tisular 50%. **INDICACIONES Y ESPECIES DE DESTINO: Perros.** Inmunización activa de perros frente a *Bordetella bronchiseptica* y virus de la parainfluenza canina durante periodos de mayor riesgo para reducir los síntomas clínicos inducidos por *B. bronchiseptica* y virus de la parainfluenza canina y para reducir la excreción del virus de la parainfluenza canina. Establecimiento de la inmunidad: Para *Bordetella bronchiseptica*: 72 horas después de la vacunación; para el virus de la parainfluenza canina: 3 semanas después de la vacunación. Duración de la inmunidad: Un año. **CONTRAINDICACIONES:** Ninguna. **PRECAUCIONES:** Solamente deben ser vacunados perros sanos. **Precauciones especiales para su uso en animales:** Los animales vacunados pueden transmitir la cepa vacunal de *Bordetella bronchiseptica* durante 6 semanas y la cepa vacunal de parainfluenza canina durante unos pocos días después de la vacunación. Un tratamiento inmunosupresor puede impedir el desarrollo de inmunidad activa y puede aumentar la probabilidad de reacciones adversas causadas por las cepas vacunales vivas. Gatos, cerdos y perros no vacunados pueden reaccionar a las cepas vacunales con síntomas respiratorios leves y transitorios. No se ha estudiado en otros animales, como conejos y pequeños roedores. **Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento veterinario a los animales:** Las personas inmunodeprimidas deben evitar todo contacto con la vacuna y los animales vacunados hasta 6 semanas después de la vacunación. Desinfectar las manos y el equipo después del uso de la vacuna. Puede utilizarse durante la gestación. Conservar y transportar refrigerado (entre 2 °C y 8 °C). No congelar. Proteger de la luz. Periodo de validez después de su reconstitución según las instrucciones: 1 hora. **Uso veterinario – medicamento sujeto a prescripción veterinaria.** Instrucciones completas en el prospecto. Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños. Reg. N.º: 1362 ESP. Merck Sharp & Dohme Animal Health, S.L. Ficha técnica actualizada a 27 de octubre de 2016.

 **MSD**
Animal Health