



- » Como con la cirugía, es necesario un mínimo de 6 semanas para lograr la esterilidad y otros efectos sobre el perro. Algunos perros pueden requerir más tiempo.
- » La primera vez que se coloca el implante, se produce un pico inicial de testosterona que puede causar un empeoramiento transitorio de los síntomas hasta 12-14 días después de la aplicación.
- » El tiempo que tarda el perro en recuperar la fertilidad es como mínimo de 6 meses, con variaciones significativas.
- » Para una esterilidad continuada, Suprelorin® puede utilizarse repetidamente.
- » Un implante por perro, independientemente del peso.
- » El implante provoca una reducción considerable del tamaño testicular, que se mantiene mientras dura su efecto. Para comprobar de forma más precisa el efecto del implante, se debe realizar un análisis de testosterona en sangre.
- » Suprelorin® es un implante biocompatible que se desintegra con el tiempo (6-12 meses). En caso necesario, se puede retirar quirúrgicamente.
- » La esterilización quirúrgica o médica puede tener consecuencias inesperadas en el comportamiento agresivo del perro macho (mejora o empeoramiento).
- » El implante es de color blanco y aspecto de cera. El plástico azul que se observa en la aguja después de la colocación del implante es un espaciador que garantiza la esterilidad.
- » Suprelorin® 4,7 mg se comercializa en cajas de 2 implantes con una jeringa reutilizable. No tirar la jeringa, se necesita para el segundo implante.



Vídeo 'Cómo implantar Suprelorin®'

SUPRELORIN® 4,7 MG IMPLANTE PARA PERROS Deslorelina (acetato) 4,7 mg. Implante cilíndrico de color blanco a amarillo pálido. **Indicaciones** Inducción de la esterilidad transitoria en perros machos sexualmente maduros, sin castrar y sanos. **Contraindicaciones e interacciones** Ninguna conocida. **Advertencias** La esterilidad se consigue a las 6 semanas y dura como mínimo 6 meses. Se recomienda esperar a que los perros alcancen la pubertad antes de iniciar el tratamiento. Las mujeres embarazadas no deberán administrar el producto. Si el producto entra en contacto con la piel lávese inmediatamente la zona. En caso de autoinyección accidental, consulte con un médico. Todo medicamento veterinario no utilizado o sus residuos deberán eliminarse según normativas locales. **Reacciones adversas** Frecuentemente puede observarse una hinchazón moderada en el lugar de implantación durante 14 días. En raras ocasiones: desórdenes en la capa del pelo, incontinencia urinaria, baja regulación asociada a los síntomas (p.ej. disminución tamaño testicular y de la actividad). En casos muy raros un testículo podrá ascender por encima del anillo inguinal. En raras ocasiones: incremento transitorio del interés sexual, incremento tamaño testicular y dolor testicular. Estos síntomas se resolvieron sin tratamiento. **Posología y modo de administración** La dosis es un implante por perro, independientemente del tamaño. El producto deberá implantarse por vía subcutánea en la piel suelta de la espalda, entre la parte inferior del cuello y la zona lumbar. Repita la administración cada seis meses a fin de mantener la eficacia. No requiere extracción. **Sobredosificación** No se han observado reacciones adversas tras la administración subcutánea de hasta 10 implantes. **Presentación** Caja con dos inyectores precargados envueltos individualmente en una bolsa de aluminio sellada y esterilizada, junto con un aplicador que se acopla al inyector mediante una conexión Luer Lock. Conservar en nevera (entre 2 °C y 8 °C). No congelar. **Titular** VIRBAC S.A. **Nº de registro** EU/2/07/072/001-02 **CON PRESCRIPCIÓN VETERINARIA.**

VP900945 · Feb 2020

Virbac responde

📞 933 716 373 📞 616 764 990

virbac.responde@virbac.es
es.virbac.com

Virbac