



● Una solución distinta

● Para cada tipo de paciente

## Prevención frente a las Enfermedades respiratorias caninas (CIRD)

El complejo CIRD son un grupo de enfermedades de etiología multifactorial que cursan con sintomatología respiratoria.

El portafolio de Nobivac® frente a enfermedades respiratorias caninas ahora ofrece dos soluciones complementarias que brindan la protección adecuada para cada perro:

NUEVA

### Nobivac®:Respira Bb

**Vacuna inyectable frente a *Bordetella bronchiseptica*.**

- Tecnología innovadora: única vacuna de subunidades que contiene el antígeno fimbrial.
- Dos presentaciones innovadoras listas para usar\* : jeringa precargada y vial multidosis.



### Nobivac®:KC

**Vacuna intranasal frente a parainfluenza canina y *Bordetella bronchiseptica*.**

- Vacuna intranasal frente a parainfluenza canina y *Bordetella bronchiseptica*.
- Autorizado para su uso en perras gestantes y cachorros desde las 3 semanas de edad.
- Rápida instauración de la inmunidad.



\*No requieren ser reconstituidas.

**NOBIVAC RESPIRA Bb SUSPENSIÓN INYECTABLE PARA PERROS/ NOBIVAC RESPIRA Bb SUSPENSIÓN INYECTABLE EN JERINGA PRECARGADA PARA PERROS. COMPOSICIÓN POR DOSIS:** Sustancia activa: *Bordetella bronchiseptica* fimbriae<sup>1</sup>: 88-399 U<sup>2</sup>. Adyuvante: Acetato de di- $\alpha$ -tocoférol: 74,7 mg. Excipiente: Tiomersal: 0,15 mg.<sup>3</sup> Purificadas de la cepa Bb7 92932. <sup>4</sup> Unidades ELISA de masa antigénica. **INDICACIONES Y ESPECIES DE DESTINO:** Perros. Para la inmunización activa de perros frente a *Bordetella bronchiseptica* para reducir los síntomas clínicos de la enfermedad del tracto respiratorio superior y la excreción bacteriana post-infección. Establecimiento de la inmunidad: 2 semanas. Duración de la inmunidad: 7 meses después de la primovacunación, 1 año después de la revacunación. **CONTRINDICACIONES:** Ninguna. **PRECAUCIONES:** Vacunar únicamente animales sanos. Puede utilizarse durante la gestación. No ha quedado demostrada la seguridad del medicamento veterinario durante los primeros 20 días de gestación. **Precauciones especiales de conservación:** Nobivac:Respira Bb suspensión inyectable para perros: Conservar en nevera (entre 2 °C y 8 °C). No congelar. Una vez abierto, conservar entre 2 °C y 25 °C. No congelar. Conservar en el embalaje original con objeto de protegerlo de la luz. Periodo de validez después de abierto el envase primario: 4 semanas. Nobivac:Respira Bb suspensión inyectable en jeringa precargada para perros: Conservar en nevera (entre 2 °C y 8 °C). No congelar. Conservar en el embalaje original con objeto de protegerlo de la luz. **Uso veterinario – medicamento sujeto a prescripción veterinaria. Administración bajo control o supervisión del veterinario.** Instrucciones completas en el prospecto. Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños. En caso de duda, consulte a su veterinario. Reg. N°: Nobivac:Respira Bb suspensión inyectable para perros; 3924 ESP. Nobivac:Respira Bb suspensión inyectable en jeringa precargada para perros; 3923 ESP. Merck Sharp & Dohme Animal Health, S.L. Ficha técnica actualizada a 8 de febrero de 2022.

**NOBIVAC KC LIOFILIZADO Y DISOLVENTE PARA GOTAS NASALES EN SUSPENSIÓN PARA PERROS. COMPOSICIÓN POR DOSIS:** Sustancias activas: Bacterias vivas de *Bordetella bronchiseptica* cepa B-C2  $\geq 10^{10}$  y  $\leq 10^{12}$  cfu<sup>1</sup>, virus de la parainfluenza canina cepa Cornell  $\geq 10^{10}$  y  $\leq 10^{12}$  TCID<sub>50</sub><sup>2</sup>. <sup>3</sup>Unidades formadoras de colonias. <sup>4</sup>Dosis infectiva de cultivo tisular 50 %. **INDICACIONES Y ESPECIES DE DESTINO:** Perros. Inmunización activa de perros frente a *Bordetella bronchiseptica* y virus de la parainfluenza canina durante períodos de mayor riesgo para reducir los síntomas clínicos inducidos por *B. bronchiseptica* y virus de la parainfluenza canina y para reducir la excreción del virus de la parainfluenza canina. Establecimiento de la inmunidad: para *Bordetella bronchiseptica*: 72 horas después de la vacunación; para el virus de la parainfluenza canina: 3 semanas después de la vacunación. Duración de la inmunidad: 1 año. **CONTRINDICACIONES:** Ninguna. **PRECAUCIONES:** Vacunar únicamente animales sanos. **Precauciones especiales para su uso en animales:** Los animales vacunados pueden transmitir la cepa vacunal de *Bordetella bronchiseptica* durante 6 semanas y la cepa vacunal de parainfluenza canina durante unos pocos días después de la vacunación. Un tratamiento inmunosupresor puede impedir el desarrollo de inmunidad activa y puede aumentar la probabilidad de reacciones adversas causadas por las cepas vacunales vivas. Gatos, cerdos y perros no vacunados pueden reaccionar a las cepas vacunales con síntomas respiratorios leves y transitorios. No se ha estudiado en otros animales, como conejos y pequeños roedores. **Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento veterinario a los animales:** Las personas inmunodeprimidas deben evitar todo contacto con la vacuna y los animales vacunados hasta 6 semanas después de la vacunación. Desinfectar las manos y el equipo después del uso de la vacuna. Puede utilizarse durante la gestación. Conservar y transportar refrigerado (entre 2 °C y 8 °C). No congelar. Proteger de la luz. Periodo de validez después de su reconstitución según las instrucciones: 1 hora. **Uso veterinario – medicamento sujeto a prescripción veterinaria.** Instrucciones completas en el prospecto. Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños. En caso de duda, consulte a su veterinario. Reg. N°: 1362 ESP. Merck Sharp & Dohme Animal Health, S.L. Ficha técnica actualizada a 10 de febrero de 2022.

**Nobivac** ●●●●●●●●●●  
La protección que nos une

**MSD**  
Animal Health