

Cambia *sus vidas*



Los cuidados de mi mascota diabética

ProZinc[®]



Boehringer Ingelheim Animal Health España, S.A.U.
Prat de la Riba, 50 - 08174 Sant Cugat del Vallés (Barcelona).
www.boehringer-ingelheim.es/salud-animal

 **Boehringer
Ingelheim**

¿Qué es diabetes mellitus?

Se trata de una enfermedad en la que los niveles de azúcar (glucosa) en la sangre están persistentemente elevados.

La insulina es una hormona que ayuda al organismo a utilizar la glucosa sanguínea y regular su nivel.

Una mascota con diabetes no produce suficiente insulina o no la utiliza adecuadamente.

SÍNTOMAS MÁS FRECUENTES

- Aumento de la sed
- Aumento del apetito
- Orina más frecuentemente y/o más cantidad
- Fatiga, apatía o debilidad
- Pérdida de peso

Si la diabetes no se trata, puede derivar en un conjunto de alteraciones internas que pueden causar el coma o la muerte.

¿Por qué su veterinario ha prescrito ProZinc® a su mascota?

ProZinc® es un tipo de insulina que se libera lentamente en el organismo, lo que ayuda a mantener estable el nivel de glucosa en sangre a lo largo del día.

El bienestar de su mascota diabética

La mayoría de los pacientes que padecen diabetes mellitus pueden estabilizarse de forma adecuada con un tratamiento, seguimiento veterinario y con medidas apropiadas.

Su veterinario determinará la dosis adecuada de ProZinc®, así como la dieta ideal y le indicará, en caso necesario, algunos cambios en el estilo de vida de su mascota.

Asegúrese de dar a su mascota la dosis correcta de ProZinc® siguiendo la pauta (dosis y horario) de forma estricta.


Mantenga un horario regular para las comidas, y administre la cantidad de alimento y snacks recomendados por su veterinario.

Evite dar a su mascota cualquier medicamento que no haya sido prescrito por su veterinario, incluyendo vitaminas o suplementos.

Alimente a su mascota antes de administrar ProZinc®

La insulina nunca debería administrarse sin asegurarse de que el paciente ha comido previamente.

Preparación de inyección



Mida la dosis que le corresponde a su mascota tal y como se muestra en la imagen



- 1 Utilice la jeringa adecuada. ProZinc® debe administrarse en una jeringa de 40 UI.
- 2 Rote suavemente el vial de ProZinc® entre sus manos. Así mezclará la insulina y calentará ligeramente el contenido para hacerlo más confortable para su mascota.
- 3 La jeringa está marcada con números que indican las unidades de insulina a administrar. Asegúrese de administrar a su mascota el número correcto de unidades prescritas por su veterinario.
- 4 Retire el tapón de la aguja y tire del émbolo hacia atrás hasta la dosis prescrita de ProZinc®.
- 5 Con el émbolo aún situado en la marca de la dosis correspondiente a su mascota, inserte la aguja en la parte superior del vial de ProZinc® y empuje el émbolo hasta el final para inyectar aire en el vial.
- 6 Coloque el vial boca abajo manteniendo la aguja insertada. Asegúrese de que la punta de la aguja está sumergida en la insulina. Tire del émbolo hacia atrás hasta superar ligeramente la dosis indicada.
- 7 Mantenga la aguja insertada en el vial.
- 8 Busque burbujas de aire en la jeringuilla. Si encuentra alguna, golpee ligeramente el lateral de la jeringa con sus dedos para liberarlas.
- 9 Empuje suavemente el émbolo hasta la dosis prescrita. Retire sus dedos del émbolo y saque la aguja del vial.

¿Cómo administrar ProZinc®?

- 1 Sitúe a su mascota en una superficie estable.
- 2 Dedique un momento a acariciar a su mascota. Lo ideal es que ambos estén tranquilos durante la administración del tratamiento.
- 3 Mientras acaricia a su mascota, coja sutilmente el pliegue de la piel del cuello o del costado. No utilice siempre el mismo lugar, deberá alternarlo en cada aplicación.
- 4 Rápidamente inserte la aguja en el pliegue de la piel con un ángulo de 45°. La aguja de insulina es muy fina, por lo que no hará daño a su mascota, sobre todo si lo hace de forma rápida.
- 5 Tire ligeramente del émbolo hacia atrás para asegurarse que no aparece sangre en la jeringa. Si ése fuera el caso, deseche esa jeringa y vuelva a empezar con una nueva.
- 6 Empuje suavemente el émbolo hasta el final de tal manera que la dosis de ProZinc® penetre por completo, retire la aguja y recompense a su mascota volviéndole a acariciar.
- 7 Deseche la jeringa en un contenedor de objetos punzantes. **CADA JERINGA ES DE UN SOLO USO.**
- 8 Almacene ProZinc® en su nevera, siempre deberá mantener el envase en posición vertical a 2-8°C. No lo congele. Protéjalo de la luz.

Desechar a los 60 días una vez abierto



Mira el vídeo con las instrucciones aquí

- 

Día: _____ **Dosis insulina:** _____ cada _____ horas

[illegible]

Seguimiento en casa del tratamiento con ProZinc®

Cumplimente cada día la información de la tabla, como en el ejemplo

Mantener una rutina de administración de insulina, comidas y ejercicio facilitará el control de la diabetes de su mascota.



Descarga la tabla aquí

Fecha	Hora	Dosis de ProZinc®	Cantidad de comida	Apetito	Sed	Orina	¿Cómo se siente tu mascota?	Notas – un lugar para grabar cualquier cosa de todo el día que quieras que tu veterinario sepa
18/01/2022	07:00	3 unid.	64 g	☐ aumentado ☐ disminuido ☒ igual	☐ aumentado ☐ disminuido ☒ igual	☐ más ☐ menos ☒ igual		Feliz y con ganas de jugar. Todo bien
	18:30	3 unid.	64 g	☐ aumentado ☐ disminuido ☒ igual	☐ aumentado ☐ disminuido ☒ igual	☐ más ☐ menos ☒ igual		
		unid.		☐ aumentado ☐ disminuido ☐ igual	☐ aumentado ☐ disminuido ☐ igual	☐ más ☐ menos ☐ igual		
		unid.		☐ aumentado ☐ disminuido ☐ igual	☐ aumentado ☐ disminuido ☐ igual	☐ más ☐ menos ☐ igual		
		unid.		☐ aumentado ☐ disminuido ☐ igual	☐ aumentado ☐ disminuido ☐ igual	☐ más ☐ menos ☐ igual		
		unid.		☐ aumentado ☐ disminuido ☐ igual	☐ aumentado ☐ disminuido ☐ igual	☐ más ☐ menos ☐ igual		
		unid.		☐ aumentado ☐ disminuido ☐ igual	☐ aumentado ☐ disminuido ☐ igual	☐ más ☐ menos ☐ igual		
		unid.		☐ aumentado ☐ disminuido ☐ igual	☐ aumentado ☐ disminuido ☐ igual	☐ más ☐ menos ☐ igual		
		unid.		☐ aumentado ☐ disminuido ☐ igual	☐ aumentado ☐ disminuido ☐ igual	☐ más ☐ menos ☐ igual		
		unid.		☐ aumentado ☐ disminuido ☐ igual	☐ aumentado ☐ disminuido ☐ igual	☐ más ☐ menos ☐ igual		
		unid.		☐ aumentado ☐ disminuido ☐ igual	☐ aumentado ☐ disminuido ☐ igual	☐ más ☐ menos ☐ igual		
		unid.		☐ aumentado ☐ disminuido ☐ igual	☐ aumentado ☐ disminuido ☐ igual	☐ más ☐ menos ☐ igual		
		unid.		☐ aumentado ☐ disminuido ☐ igual	☐ aumentado ☐ disminuido ☐ igual	☐ más ☐ menos ☐ igual		
		unid.		☐ aumentado ☐ disminuido ☐ igual	☐ aumentado ☐ disminuido ☐ igual	☐ más ☐ menos ☐ igual		

Mañana

Noche

Su veterinario ha recetado ProZinc® a su mascota para que se lo administre diariamente en casa.

Dosificación: _____ U/I de ProZinc® cada _____ h.

Fecha de revisión: _____.

**Este folleto acompaña a la receta de ProZinc®, como ayuda
auxiliar tras el diagnóstico de diabetes *mellitus***

Preguntas frecuentes

¿QUÉ DEBO HACER SI ADMINISTRO UNA DOSIS INCORRECTA DE PROZINC® O SI OMITO UNA INYECCIÓN?

Contacte con su veterinario o un servicio de urgencias veterinarias inmediatamente.

¿QUÉ EFECTOS SECUNDARIOS PUEDEN APARECER?

Son poco frecuentes. Pueden aparecer bajos niveles de glucosa en sangre (hipoglucemia), especialmente durante el periodo inicial de establecimiento de dosis. Los signos de hipoglucemia pueden aparecer repentinamente y suelen incluir debilidad, espasmos musculares, depresión, apatía, lentitud, convulsiones, marcha vacilante y comportamiento inusual.

Contacte con su veterinario de inmediato.