

PROTOS DE VACUNACIÓN Y DESPARASITACIÓN EN CACHORROS HASTA EL AÑO DE EDAD

Para garantizar la protección del perro adulto es esencial respetar el programa de vacunación tanto de las hembras gestantes como de sus cachorros.

CACHORROS

HEMBRAS^e

EDAD DEL CACHORRO (SEMANAS)		2	4	6	8	12	16	20	24	26-52	HEMBRAS ^e		
VACUNACIÓN	TOS DE LAS PERRERAS		✓ ^a	✓ ^b						Primer recuerdo	HERPESVIRUS		
	PARVOVIRUS			✓	✓ ^c	✓	✓			Primer recuerdo	1 ^a DOSIS Durante celo o 7-10 días tras el apareamiento		
	MOQUILLO				✓	✓	✓			Primer recuerdo	2 ^a DOSIS 1-2 semanas antes del parto		
	ADENOVIRUS				✓	✓	✓			Primer recuerdo	Reproducción ^f	Gestación ^f	Lactación ^f
	PARAINFLUENZA					✓	✓			Primer recuerdo	✓	✓	✓
	LEPTOSPIRA					✓	✓			Primer recuerdo	✓	✓	✓
	RABIA					✓ ^d				Primer recuerdo	✓	✓	✓
DESPARASITACIÓN	PULGAS, GARRAPATAS ^f	Insecticida-acaricida adecuado a la edad si infestaciones			✓	✓	✓	✓	✓	Control antiparasitario continuo mes a mes en caso de riesgo	✓	✓	✓
	GUSANOS REDONDOS INTESTINALES ^g	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	DIROFILARIOSIS Y GUSANOS PULMONARES ^h	Menor riesgo			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	GUSANOS PLANOS INTESTINALES	Menor riesgo			Cestocida si infecciones o cada 6 semanas en caso de riesgo ⁱ						Cestocida si infecciones o cada 6 semanas en caso de riesgo ⁱ		

Adaptación de información proveniente de diferentes guías de expertos a nivel mundial (WSAVA, ESCCAP, CAPC, AAHA 2022).¹⁻⁴

Póster creado por el laboratorio de

¹1^a dosis a la 4^a semana si madre no vacunada. ²2^a dosis a la 6^a semana si madre no vacunada. Si madre vacunada, 1^a dosis a la 6^a semana y 2^a dosis a la 8^a semana. ³Según las guías AAHA 2022, si la primovacunación se inicia a las 8-9 semanas, se recomienda administrar un mínimo de 3 dosis de las vacunas esenciales. Sin embargo, cuando se inicia a las 6-7 semanas, el número de dosis de vacunas esenciales puede ser superior.^{1,5} ⁴El programa de vacunación contra la rabia está sujeto a las regulaciones vigentes de cada comunidad autónoma. En ciertas regiones, puede ser obligatoria una revacunación mensual adicional después de la primera dosis administrada. ⁵Perras reproductoras de riesgo. ⁶Según riesgo y situación epidemiológica local. Para muchos perros, riesgo continuo. ⁷Principalmente dirigida a *Toxocara canis*. Administrar antihelmíntico adecuado a la edad. ⁸Según riesgo y situación epidemiológica local. *Dirofilaria immitis* está presente en toda la geografía española. ⁹Perros de riesgo: dieta a base de alimentos crudos sin procesar, vísceras o presas. ¹⁰Los parásitos que se transmiten más frecuentemente de madres a cachorros son las pulgas y los vermes redondos intestinales, por ello, es importante la desparasitación de las madres.

Referencias: 1. Day MJ, Horzinek MC, Schultz RD, et al. Guidelines for the vaccination of dogs and cats. J Small Anim Pract. 2016;57:WSAVA. 2. ESCCAP. Control de Vermes en Perros y Gatos. Guía nº 01, 6^a ed. Mayo 2021. Disponible en: https://www.esccap.org/uploads/docs/bfjvkl_1272_ESCCAP_GL1_Spanish_v3_1p.pdf. Último acceso: enero 2024. 3. CAPC. Guidelines. Disponible en: <https://capcvet.org/guidelines/>. Último acceso: enero 2024. 4. Ellis J, Marziani E, Aziz C, et al. 2022 AAHA Canine Vaccination Guidelines. J Am Anim Hosp Assoc. 2022 Sep 1;58(5):213-230. 5. Montoya-Alonso JA, Morchón R, García-Rodríguez SN, et al. Expansion of Canine Heartworm in Spain. Animals. 2022;12:1268.

LO SUYO ES EXPLORAR, LO NUESTRO ES PROTEGERLOS

Descubre una gama de productos que los cuida en esta etapa para que crezcan felices, sanos y protegidos.

EURICAN



Parainfluenza
y bordetella



Parvovirus



Adenovirus
y moquillo canino



Leptospira



Rabia



Herpesvirus

NexGard SPECTRA



Pulgas



Garrapatas



Ácaros



Ascáridos,
anquilostomas
y tricúridos



Dirofilaria



Vermes
pulmonares



Vermes
oculares



FICHA TÉCNICA DE
NEXGARD SPECTRA®

En caso de duda consulte
a su veterinario.